



ATLAS HUB 05. 01. 2012

## **Muchomůrka citrónová /Amanita citrina/**

**Klobouk** mívá průměr 4 - 10 cm. Je polokulovitý, pak sklenutý až rozložený, hladký, často pokrytý bílými až žlutavými strupy. **Třeň** je bílý, S...

### **☒ ■ Muchomůrka citrónová - vzhled**

**Klobouk** mívá průměr 4 - 10 cm. Je polokulovitý, pak sklenutý až rozložený, hladký, často pokrytý bílými až žlutavými strupy.

**Třeň** je bílý, s trvalým převalým prstenem (žlutavým nebo bílým) a s širokou odsedlou hlízou neobalenou zbytkem plachetky.

**Dužnina** je bílá, páchnoucí po syrových bramborech. Výtrusný prach je bílý.

## ■ Muchomůrka citrónová - výskyt

**Muchomůrka citrónová** roste velmi hojně od jara do podzimu (červen až listopad) v lesích jehličnatých a smíšených, méně též v lesích listnatých, zejména pod borovicemi a smrky.

## ■ Muchomůrka citrónová - vliv na zdraví

**Muchomůrka citrónová** je často považována za **smrtelně jedovatý druh** podobně jako **muchomůrka zelená**. Zejména čistě bílé albinické formy bývají často nesprávně zařazovány. Nejbezpečnějším rozlišovacím znakem je vůně po klíčících bramborách. Muchomůrka zelená a její bílé variety voní příjemně nasládle, podobně jako umělý med.

Poznámka: **muchomůrka citrónová** je méně nebezpečná proto, že jedovaté látky v ní obsažené se ničí silným zahříváním (vařením, pečením). Obsahuje bufotenin, který zrychluje srdeční rytmus a zužuje cévy.

## ■ Muchomůrka citrónová - možnosti využití

V mladším stádiu je možné si muchomůrku citrónovou splést třeba s některou pečárkou nebo taky s **muchomůrkou zelenou**. U lupenatých hub je velice důležité při sbírání vyjmout celý třeh ze země, aby bylo patrné, zda je na něm pochva či nikoli. Potom záměna za pečárku nehrozí. Je až s podivem, kolik lidí každoročně končí na nemocničním lůžku nebo v márnici po otravě muchomůrkou zelenou. U muchomůrky citrónové se vám tohle sice nestane, ale i tak tuto jedovatou houbu nechte být.