



ATLAS HUB 20. 02. 2012

Ryzec modřínový / *Lactarius porninsis*/

Klobouk má ryzec modřínový široký 3 - 8 cm, v dospělosti na středu vmáčklý, bez hrbolku, masitý, za vlhka slizký, jinak suchý, se soustřednými pásy...



■ Ryzec modřínový - vzhled

Klobouk má ryzec modřínový široký 3 - 8 cm, v dospělosti na středu vmáčklý, bez hrbolku, masitý, za vlhka slizký, jinak suchý, se soustřednými pásy nebo bez nich, oranžově žlutý až oranžově červený. **Lupeny** jsou nízké, dosti husté, mírně sbíhající na třeň, nažloutlé až oranžově okrové.

Třeň 3 - 7 x 1 - 2 cm, ve stáří dutý, okrový až oranžový.

Dužnina tvrdá, v klobouku bělavá, ve třeni se slabým oranžově okrovým nádechem, s jablečnou

vůní, palčivá vylučovaným mlékem. Mléko bílé až vodnatě bělavé, na vzduchu nemění barvu, bezprostředně po ochutnání mírné, po chvíli palčivé a nahořklé.

■ **Ryzec modřínový - výskyt**

Ryzec modřínový roste pouze pod modříný v podhorském až vysokohorském stupni.

■ **Ryzec modřínový - vliv na zdraví**

Pro hořkost je tato **houba nejedlá**.