



ATLAS HUB 20. 02. 2012

## Ryzec šeredný /*Lactarius turpis*/

**Ryzec šeredný má klobouk 6 - 20 cm, v mládí nízce sklenutý, později na středu vtlačený, bez hrbolku, masitý, nápadně tvrdý, na okraji dlouho...**

### ☒ ■ Ryzec šeredný - vzhled

**Ryzec šeredný má klobouk 6 - 20 cm, v mládí nízce sklenutý, později na středu vtlačený, bez hrbolku, masitý, nápadně tvrdý, na okraji dlouho podvinutý a v mládí pokrytý olivově nažloutlou plstí, jinak lysý, za vlhka slizký, obvykle nepásovaný, olivově hnědý až hnědočerný.**

**Lupeny** nízké, husté, nestejně dlouhé, často vidlené, ve stáří krátce sbíhající na třěh, za vlhka slzící, zpočátku bělavý, později nažloutlé, po otláčení a ve stáří místy i samovolně tmavnoucí do šedohněda až červena.

**Třeň** 3 - 7 x 1,5 - 3 cm, válcovitý, ve stáří dutý, za vlhka mírně slizký, za sucha většinou lesklý,

někdy dubkatý až jamkatý, světle olivový až žlutoolivový, ve stáří se šedohnědým až černavým tónem.

**Dužnina** silná, velmi tvrdá a kompaktní, bělavá až nažloutlá, na řezu mírně hnědnoucí, s nevýraznou vůní a palčivou chutí. Mléko hojné, velmi palčivé, bílé, na vzduchu po delší době slabě šednoucí až šedo zelenající.

## ■ Ryzec šeredný - výskyt

**Ryzec šeredný** roste hojně pod břízami a smrky, vzácněji pod jinými stromy. Dává přednost kyselým půdám.

## ■ Ryzec šeredný - vliv na zdraví

Tato **houba** nevyvolává pravé otravy, poškozuje zdraví skrytým, zákeřnějším způsobem - obsahuje mutagenní látky, které **mění dědičný základ buněk**.

## ■ Ryzec šeredný - možnosti využití

**Ryzec šeredný je nejedlý.**