



ATLAS HUB 23. 12. 2011

## Strmělka přehrnutá /*Lepista flaccida*/

**Klobouk** má v průměru 5 - 10 cm, v mládí je vyklenutý, později plochý s podvinutým okrajem, nálevkovitý se zprohýbaným ostrým okrajem, bez hrbolku na...

### ☒ ■ Strmělka přehrnutá - vzhled

**Klobouk** má v průměru 5 - 10 cm, v mládí je vyklenutý, později plochý s podvinutým okrajem, nálevkovitý se zprohýbaným ostrým okrajem, bez hrbolku na středu. Povrch je hladký, holý, slabě lesklý. **Strmělka přehrnutá** má kožově žlutou, okrově oranžovou až rezavě hnědou barvu, ve středu tmavší.

Lupeny jsou sbíhavé na třeh, tenké, husté, v mládí mají krémovou barvu, později rezavě žlutou nebo

rezavě hnědou.

**Třeň** je 3 - 5 cm vysoký, do 1, 5 cm tlustý, válcovitý, hladký, v mládí plný, později vatovitě vycpaný až dutý. Na bázi je kyjovitě rozšířený, bíle plstnatý. Barvu má podobnou jako klobouk nebo narezlou.

**Dužnina** je zpočátku tuhá, později měkne, má krémovou barvu, někdy narezlou. Vůni má slabě houbovou, chuť nakyslou až nahořklou. Výtrusný prach je bílý, výtrusy kulovité, jemně bradavčité, 3 - 5 × 3 - 4, 5 mm velké.

## ■ Strmělka přehrnutá - výskyt

**Strmělka přehrnutá** se vyskytuje od srpna do listopadu, v jehličnatých, listnatých i smíšených lesích. **Strmělka přehrnutá** je velmi hojná, roste v řadách nebo čarodějných kruzích.

## ■ Strmělka přehrnutá - vliv na zdraví

**Strmělka přehrnutá**, dříve považovaná za neškodnou, je prokazatelně jedovatá, i když toxiny nebyly analyzovány.

## ■ Strmělka přehrnutá - možnosti využití

Tato houba **není jedlá**.