



Falešná březost u fen: jak ji rozeznat a předcházet, aby byla fenka v klidu a pohodě

Falešná březost znamená, že fenka projevuje příznaky těhotenství a blížícího se porodu, i když štěňata vůbec nečeká. Většinou se objevuje přibližně...

Pseudogravidita neboli také falešná březost je stav, kdy fenka krátce po hárání imituje březost a někdy dokonce i porod. Nejobvyklejším příznakem je například radikální změna chování fenky nebo zvětšující se prsní žlázy. Falešná březost není žádná porucha, ale jedná se o přirozenou věc. Přinášíme vám proto rady, jak falešnou březost rozeznat, jak fenku pomoci a jak jí především předcházet.

Falešná březost a jak ji zaručeně poznáte

Falešná březost znamená, že fenka projevuje **příznaky těhotenství a blížícího se porodu**, i když štěňata vůbec nečeká. Většinou se objevuje přibližně dva měsíce po hárání, kdy fenka začne měnit svoje chování a návyky. Během falešné březosti se **fenka připravuje na to, že porodí** mláďata a veškeré své činnosti a chování tomu podřizuje. Například vytváří pelíšek pro štěňata, shromažďuje do něj hračky. A co všechno ještě můžeme od fenky s falešnou březostí očekávat?

- Otok mléčné žlázy a sekrece mléka
- Zvýšená chuť k jídlu
- Zvětšení břišní dutiny
- Příprava pelechu pro štěňata
- Imitace porodu
- Nechutenství a zvracení
- Stahy břišní stěny
- Péče o hračky jako o mláďata

- Zvýšená teplota
- Průjmy
- Pomalost a opatrnost v pohybu
- Agresivita
- Přílišná mazlivost

Některá plemena psů mají výraznější projevy falešné březosti. Jsou jimi například **jezevčáci, pudlové** anebo fenky, které jsou velmi dobře živené a mají silnou vazbu na svého majitele.

Proč vůbec falešná březost vzniká a můžu ji zaměnit s něčím jiným?

V organismu feny asi měsíc až dva měsíce **po skončení hárání probíhají hormonální změny.** Vlivem na mozek a ostatní orgány hormony způsobí, že je fena a její tělo přesvědčeno, že je březí a bude rodit. Podle toho se také začne fena chovat, jelikož čeká přírůstek.

Je nutné dobře sledovat projevy feny, které jsme si popsali výše. **Někdy mohou být ale některé příznaky falešné březosti spojeny s něčím mnohem nebezpečnějším,** třeba se zánětem dělohy nebo jiným onemocněním. Pokud majitel fenky vidí, že se její chování rapidně mění, je vždy lepší **zajít rovnou k veterináři,** aby buď **potvrdil nebo vyloučil** falešnou březost a mohl stanovit přesnou diagnózu.

Jak se s falešnou březostí feny vypořádat

Falešná březost u fen není náročná jen pro samotnou fenu, ale také pro jejího majitele. Je potřeba se **vyzbrojit trpělivostí a shovívavostí** a uvědomit si, že se jedná o přirozený průběh, a ne žádnou poruchu či vadu. Pokud má fenka slabé příznaky a **její falešná březost je mírná,** vypořádáte se s ní poměrně hladce. Postačí například:

- **Odebrat feně hračky** - aby neměla potřebu starat se o ně jako o svá mláďata
- **Přerušovat jí snahu o vytváření peľechu** pro štěňata
- Zajistit jí **dostatek pohybu** a jiných aktivit - jen tak se fena unaví a nebude mít sílu připravovat se na falešný porod
- **Omezit noční příjem vody**

Doporučuje se také **snížit fence přísun krmiva.** Nejprve první den odebereme krmení úplně, poté asi **7 až 10 dní** podáváme krmivo **s nízkým obsahem bílkovin.** Krmná dávka by měla být trochu menší než obvykle. A protože fena v období falešné březosti dostává méně jídla, je nezbytné, aby její **strava byla především kvalitní.**

Co dělat, když je falešná březost silná

Pokud však fenka prodělává **silnou falešnou březost,** je potřeba vzít ji urychleně k veterináři. Jestli se totiž spustí feně mléko, jsou **struky nateklé a bolestivé.** S tím vypomůže jedině zvěrolékař, který může zabránit zánětu mléčné žlázy. Fenku pak léčí například pomocí **masťi i tablet,** které snižují sekreci mléka. V žádném případě se ale nesnažte feně pomoci tak, že mléko budete odšťikávat. Tím vše jen zhoršíte, protože masírováním se produkce mléka ještě zvýší. Ani ji nenechte, aby si struky olizovala, proto využijte **límeč kolem krku.**

Jak předcházet falešné březosti

Falešná březost má v oblibě se **často vracet a opakovat**. Někdy dokonce i po každé říji. Jestli nechcete fenku využít k chovu a chcete jí ušetřit od zbytečného trápení a možné bolesti, mnozí vám doporučí **kastraci feny**. Jen tak vyřešíte nadobro problém s falešnou březostí feny. Navíc je pravděpodobné, že odstranění dělohy a vaječnicků uchrání fenku v pozdějším věku před mnohými obtížemi, jako je například zánět dělohy nebo cisty na vaječnicích. Jestli ale nechcete sáhnout po tak razantním kroku, veterinář vám nabídne například podávání **antikoncepčních pilulek** pro fenku.